

# Basistabel DSAA

		Aneurysma chirurgie (2013-2014)					
Jaartal		2013			2014		
(dd 20150317) N=5627		Acuut geruptureerd	Acuut niet-geruptureerd	Electief	Acuut geruptureerd	Acuut niet-geruptureerd	Electief
Aantal patiënten		n=423	n=150	n=1978	n=469	n=201	n=2406
Urgentie		17%	5,8%	77%	15%	6,5%	78%
Uitgebreide vragenlijst		4,2%	35%	36%	29%	22%	24%
Patiëntkenmerken							
Leeftijd (gem, Jaren)		75	74	73	74	73	73
Geslacht							
man		84%	79%	88%	87%	85%	86%
vrouw		16%	21%	12%	13%	15%	14%
Diameter (gem, mm,)		77	67	60	81	69	61
Hartfrequentie (BPM)		85	77	73	86	80	73
Bloeddruk (mmHg)		110	146	140	112	144	140
Comorbiditeit							
Cardiale status							
geen cardiale VG		41%	43%	47%	44%	49%	44%
perifeer oedeem		5,9%	10,0%	7,4%	7,7%	3,5%	9,1%
verhoogd CVD		1,4%	3,3%	1,9%	1,3%	0,5%	1,0%
medicatie voor hypertensie		23%	32%	36%	34%	45%	43%
onbekend		29%	12%	7,4%	13%	2,5%	2,7%
Pulmonale status							
geen dyspnoe		56%	72%	75%	62%	74%	76%
dyspnoe inspanning		16%	14%	19%	15%	16%	19%
invaliderende dyspnoe		2,6%	3,3%	3,4%	3,4%	1,0%	2,3%
dyspnoe rust/fibroze		2,1%	2,7%	1,1%	2,1%	1,0%	1,1%
onbekend		2,4%	8%	2%	1,7%	8,5%	1,3%
Maligniteit							
geen		87%	91%	79%	87%	87%	80%
alleen primair		1,7%	1,3%	3,6%	2,6%	3,0%	4,2%
lymfekliermetastasen		5,9%	6,7%	14,0%	8,1%	7,5%	13,0%
afstandsmetastasen		0,9%	0,0%	0,7%	0,4%	2,0%	0,4%
onbekend		4,7%	1,3%	3,5%	2,1%	0,5%	2,6%
Laboratorium uitslagen							
hemoglobine		7,2	8,4	8,7	7,3	8,3	8,7
leukocyten		12	9,2	8,2	12	9,8	8,4
natrium		138	138	140	138	138	140
kalium		4,1	4,1	4,2	4,1	4,2	4,3
kreatinine		121	99	98	115	96	99
Diagnostiek							
ECG							
niet afwijkend		34%	52%	65%	32%	48%	59%
AF 60-90		4,9%	8,7%	7,7%	5,8%	5,5%	6,7%
Ischaemie/7		3,9%	0,7%	2,3%	3,2%	4,0%	1,5%
elke andere afwijking		14%	18%	18%	15%	23%	23%
geen ECG gemaakt		43%	21%	7,1%	44%	12%	10%
Preoperatief MDO		7,3%	13%	31%	10%	25%	54%
onbekend*		45%	46%	52%	16%	12%	17%
Behandeling							
Uitgevoerde procedure							
EVAR		28%	48%	72%	35%	55%	75%
geconverteerd		0,9%	0,7%	0,5%	1,9%	1,0%	0,1%
open		71%	51%	27%	63%	44%	25%
Peritoneale contaminatie							
geen		75%	93%	91%	77%	92%	98%
minimaal vocht		5,9%	2,0%	0,5%	4,3%	3,5%	0,5%
abces		0,2%	0,7%	0,1%	0,4%	1,5%	0,1%
peritonitis		13%	0,0%	0,3%	16%	2,5%	0,3%
onbekend		5,4%	4,0%	7,9%	2,1%	0,0%	1,2%

# Basistabel DSAA

Peroperatieve complicaties							
geen	80%	95%	95%	80%	90%	96%	
reanimatie MI	8,1%	0,0%	0,2%	6,6%	1,0%	0,1%	
niet geplande afsluit hypogastr,	0,5%	0,0%	0,4%	1,1%	1,0%	0,3%	
geplande afsluit hypogastr,	1,0%	0,0%	0,8%	1,1%	1,0%	0,5%	
darmletsel	1,7%	0,0%	0,2%	1,5%	1,0%	0,2%	
ureterletsel	0,2%	0,7%	0,3%	0,2%	0,0%	0,0%	
anders	8,1%	4,7%	3,5%	9,8%	6,0%	2,9%	
Nierinsuff,							
tijdelijke dialyse	14%	2,7%	1,2%	12%	4,5%	1,2%	
blijvend dialyse	17%	0,7%	0,1%	1,7%	0,1%	0,4%	
onbekend*	32%	65%	81%	40%	64%	80%	
Opnameduur	15	9	7	14	10	6	
Heropname	3,5%	6,7%	3,6%	6,2%	9,5%	5,6%	
onbekend*	43%	45%	46%	13%	7,5%	12%	
Overleden	35%	8,7%	1,9%	25%	7%	2,2%	

BPM; Beats per minute, VG; Voorgeschiedenis, CVD; centraal veneuze druk, ECG; electrocardiogram, AF; atrium fibrilleren.

MDO; multidisciplinair overleg, EVAR; endovasculaire aneurysma repair, MI; Myocard infarct.

\*Wordt alleen in de uitgebreide vragenlijst uitgevraagd