

Factsheet indicatoren aneurysma aorta abdominalis (DSAA) 2019

DSAA 2019.2

Registratie gestart: 1 januari 2013

| Datum | Versie | Mutatie | Eigenaar |
|------------|--------|--|----------|
| 27-07-2015 | 2015.1 | Aanpassingen conform indicatoredagen juni 2015 | DICA |
| 21-10-2015 | 2016.1 | Aanpassingen conform indicatoredagen oktober 2015 | DICA |
| 04-07-2016 | 2017.1 | Aanpassingen conform indicatoredagen juni 2016 | DICA |
| 27-06-2017 | 2018.1 | Aanpassingen conform indicatoredagen juni 2017 | DICA |
| 27-10-2017 | 2018.2 | Transparantie is toegevoegd | DICA |
| 23-03-2018 | 2019.1 | Concept indicatoren verslagjaar 2019 | DICA |
| 18-12-2018 | 2019.2 | Toevoeging besluitvorming BOT m.b.t. transparantie | DICA |

Inclusie & exclusie criteria DSAA

Inclusie

- Alle patiënten bij wie een chirurgische/endovasculaire behandeling wordt gestart voor een aneurysma of dissectie van de abdominale en/of thoracale aorta. Hierbij worden alle electieve patiënten, patiënten met een acuut symptomatisch en patiënten met een geruptureerd aneurysma of dissectie van de aorta meegenomen.
- Alle patiënten bij wie een operatieve behandeling is gestart maar niet afgemaakt wordt wegens het overlijden van de patiënt.
- Alle patiënten waarbij een revisie van een eerder aangelegde aorta prothese plaatsvindt.

Exclusie

- Conservatieve behandeling middels surveillance. Wanneer er na surveillance toch over wordt gegaan tot operatieve behandeling, komt de patiënt wel in aanmerking.

| Nr. | Indicator | Type indicator | Uitvraag over (jaar) | Bron | Transparantie |
|-----|---|----------------|----------------------|------|---------------|
| 1. | Aantal patiënten met een aneurysma aortae abdominalis in aortasegment C dat primair electief geïntervenieerd is. | Structuur | 2019 | DSAA | Verplicht |
| 2. | Aantal patiënten met een aneurysma aortae of dissectie waarbij operatief geïntervenieerd is. | Structuur | 2019 | DSAA | Verplicht |
| 3. | Percentage patiënten dat een primaire interventie ondergaat vanwege een aneurysma aortae abdominalis in aortasegment C, dat overlijdt binnen 30 dagen na de interventie of in dezelfde ziekenhuisopname. | Uitkomst | 2017-2019 | DSAA | Verplicht |
| 4. | Percentage patiënten dat een primaire interventie ondergaat vanwege een aneurysma aortae abdominalis in aortasegment C, met complicaties binnen 30 dagen na de interventie of in dezelfde ziekenhuisopname. | Uitkomst | 2017-2019 | DSAA | Verplicht |
| 5. | Percentage patiënten dat een primaire interventie ondergaat vanwege een aneurysma aortae abdominalis in aortasegment C en een re-interventie ondergaat binnen 30 dagen na de interventie of in dezelfde ziekenhuisopname vanwege een complicatie. | Uitkomst | 2017-2019 | DSAA | Verplicht |
| 6. | Percentage patiënten dat een primaire interventie ondergaat vanwege een aneurysma aortae abdominalis in aortasegment C dat ongepland is heropgenomen binnen 30 dagen na ontslag. | Uitkomst | 2017-2019 | DSAA | Verplicht |

| 1. Volume AAA operatie segment C | |
|----------------------------------|---|
| Indicator | |
| Operationalisatie | Aantal patiënten met een aneurysma aortae abdominalis in aortasegment C waarbij primair electief geïntervenieerd is. |
| Teller | Aantal patiënten met een aneurysma aortae abdominalis in aortasegment C waarbij primair electief geïntervenieerd is. |
| Definitie (s) | Het betreft hier de open of endovasculaire exclusie van het aneurysma aortae abdominalis waarbij voor de operatieve procedure de aortaklem onder de mesenterica superior heeft gestaan of een endoprothese is geplaatst met ten hoogste fenestraties voor de nierarteriën. http://heelkunde.nl/sites/heelkunde.nl/files/Normen_7.0_definitief.pdf |
| In-/ exclusiecriteria | Zie DSAA in- / exclusiecriteria |
| Norm | Conform de NVvH norm: In de zorginstelling (ziekenhuislocatie) worden minimaal twintig primaire niet geruptureerde aorta abdominalis aneurysma interventies in aorta segment C per jaar verricht. Indien deze volumennorm niet wordt behaald, geldt als alternatief een volume van minimaal 40 in de DSAA geregistreerde aorta interventies bij indicator 3. |
| Uitvraag over periode | 01-01-2019 t/m 31-12-2019 |

| 2. Totale volume aorta aneurysma en dissectie operaties | |
|---|--|
| Indicator | |
| Operationalisatie | Aantal patiënten met een aneurysma aortae of dissectie waarbij operatief geïnterveneerd is. |
| Teller A | Aantal patiënten met een aneurysma aortae of dissectie waarbij operatief geïnterveneerd is. |
| Teller B | Aantal patiënten met een aneurysma aortae of dissectie in segment A waarbij operatief geïnterveneerd is. |
| Teller C | Aantal patiënten met een aneurysma aortae of dissectie in segment B waarbij operatief geïnterveneerd is. |
| Teller D | Aantal patiënten met een aneurysma aortae of dissectie in segment C waarbij operatief geïnterveneerd is. |
| Teller E | Aantal patiënten met een aneurysma aortae of dissectie in segment B/C of A/B/C waarbij operatief geïnterveneerd is. |
| Definitie (s) | Het betreft hier alle operatieve of endovasculaire exclusies van het aneurysma aortae of dissectie van de aorta. Segment A: Aorta ascendens tot aan de arteria subclavia links Segment B: Aorta descendens vanaf de arteria subclavia links tot aan de arteria mesenterica superior Segment C: Abdominale aorta distaal van de arteria mesenterica superior |
| In-/ exclusiecriteria | Zie DSAA in- / exclusiecriteria |
| Norm | Conform NVvV norm: http://nvvv-vaatchirurgie.nl/sites/nvvv-vaatchirurgie.nl/files/Document%20aorta%20aneurysmata%2C%206.2.pdf |
| Uitvraag over periode | 01-01-2019 t/m 31-12-2019 |

| 3. Mortaliteit | |
|-----------------------|---|
| Indicator | |
| Operationalisatie | Percentage patiënten dat een primaire operatie/interventie* ondergaat vanwege een aneurysma aortae abdominalis in aortasegment C, dat overlijdt binnen 30 dagen na de operatie/interventie of in dezelfde ziekenhuisopname. |
| Teller A | Aantal patiënten dat een primair electieve operatie/interventie* ondergaat vanwege een aneurysma aortae abdominalis in aortasegment C, dat overlijdt binnen 30 dagen of in dezelfde ziekenhuisopname. |
| Teller B | Aantal patiënten dat een primaire operatie/interventie* ondergaat vanwege een acuut symptomatisch aneurysma aortae abdominalis in aortasegment C, dat overlijdt binnen 30 dagen of in dezelfde ziekenhuisopname. |
| Teller C | Aantal patiënten dat een primaire operatie/interventie* ondergaat vanwege een geruptureerd aneurysma aortae abdominalis in aortasegment C, dat overlijdt binnen 30 dagen of in dezelfde ziekenhuisopname. |
| Noemer A | Aantal patiënten dat een primair electieve operatie/interventie* ondergaat vanwege een aneurysma aortae abdominalis in aortasegment C. |
| Noemer B | Aantal patiënten dat een primaire operatie/interventie* ondergaat vanwege een acuut symptomatisch aneurysma aortae abdominalis in aortasegment C. |
| Noemer C | Aantal patiënten dat een primaire operatie/interventie* ondergaat vanwege een geruptureerd aneurysma aortae abdominalis in aortasegment C. |
| Definitie (s) | * Operatie/interventie: zowel de open als endovasculaire behandeling van het aneurysma. |
| In-/ exclusiecriteria | Zie DSAA in- / exclusiecriteria |
| Norm | - |
| Uitvraag over periode | 01-01-2017 t/m 31-12-2019 (berekend over 3 jaren) |
| Toelichting | Er zal casemix correctie worden toegepast. |

| 4. Complicaties | |
|-----------------------|--|
| Indicator | |
| Operationalisatie | Percentage patiënten dat een primaire operatie/interventie* ondergaat vanwege een aneurysma aortae abdominalis in aortasegment C, met complicaties binnen 30 dagen na de operatie/interventie of in dezelfde ziekenhuisopname. |
| Teller A | Aantal patiënten dat een primair electieve operatie/interventie* ondergaat vanwege een aneurysma aortae abdominalis in aortasegment C, met complicaties binnen 30 dagen na de operatie/interventie of in dezelfde ziekenhuisopname. |
| Teller B | Aantal patiënten dat een primaire operatie/interventie* ondergaat vanwege een acuut symptomatisch aneurysma aortae abdominalis in aortasegment C, met complicaties binnen 30 dagen na de operatie/interventie of in dezelfde ziekenhuisopname. |
| Teller C | Aantal patiënten dat een primaire operatie/interventie* ondergaat vanwege een geruptureerd aneurysma aortae abdominalis in aortasegment C, met complicaties binnen 30 dagen na de operatie/interventie of in dezelfde ziekenhuisopname. |
| Noemer A | Aantal patiënten dat een primair electieve operatie/interventie* ondergaat vanwege een aneurysma aortae abdominalis in aortasegment C. |
| Noemer B | Aantal patiënten dat een primaire operatie/interventie* ondergaat vanwege een acuut symptomatisch aneurysma aortae abdominalis in aortasegment C. |
| Noemer C | Aantal patiënten dat een primaire operatie/interventie* ondergaat vanwege een geruptureerd aneurysma aortae abdominalis in aortasegment C. |
| Definitie (s) | *Operatie/interventie: zowel de open als endovasculaire behandeling van het aneurysma. |
| In-/ exclusiecriteria | Zie DSAA in- / exclusiecriteria |
| Norm | - |
| Uitvraag over periode | 01-01-2017 t/m 31-12-2019 (berekend over 3 jaren) |
| Toelichting | Er zal casemix correctie worden toegepast. |

| 5. Re-interventie | |
|-----------------------|--|
| Indicator | |
| Operationalisatie | Percentage patiënten dat een primaire operatie/interventie* ondergaat vanwege een aneurysma aortae abdominalis in aortasegment C en een re-interventie** ondergaat binnen 30 dagen na de operatie/interventie of in dezelfde ziekenhuisopname vanwege een complicatie. |
| Teller A | Aantal patiënten dat een primaire electieve operatie/interventie* ondergaat vanwege een aneurysma aortae abdominalis in aortasegment C en een re-interventie** ondergaat binnen 30 dagen na de operatie/interventie of in dezelfde ziekenhuisopname vanwege een complicatie. |
| Teller B | Aantal patiënten dat een primaire operatie/interventie* ondergaat vanwege een acuut symptomatisch aneurysma aortae abdominalis in aortasegment C en een re-interventie** ondergaat binnen 30 dagen na de operatie/interventie of in dezelfde ziekenhuisopname vanwege een complicatie. |
| Teller C | Aantal patiënten dat een primaire operatie/interventie* ondergaat vanwege een geruptureerd aneurysma aortae abdominalis in aortasegment C en een re-interventie** ondergaat binnen 30 dagen na de operatie/interventie of in dezelfde ziekenhuisopname vanwege een complicatie. |
| Noemer A | Aantal patiënten dat een primair electieve operatie/interventie* onderging vanwege een aneurysma aortae abdominalis in aortasegment C. |
| Noemer B | Aantal patiënten dat een primaire operatie/interventie* onderging vanwege een acuut symptomatisch aneurysma aortae abdominalis in aortasegment C. |
| Noemer C | Aantal patiënten dat een primaire operatie/interventie* onderging vanwege een geruptureerd aneurysma aortae abdominalis in aortasegment C. |
| Definitie (s) | *Operatie/interventie: zowel de open als endovasculaire behandeling van het aneurysma. **Re-interventie: elke invasieve re-interventie (endovasculaire, percutaan of operatief). |
| In-/ exclusiecriteria | Zie DSAA in- / exclusiecriteria |
| Norm | - |
| Uitvraag over periode | 01-01-2017 t/m 31-12-2019 (berekend over 3 jaren) |
| Toelichting | Er zal casemix correctie worden toegepast. |

| 6. Heropname | |
|-----------------------|---|
| Indicator | |
| Operationalisatie | Percentage patiënten dat een primaire operatie/interventie* ondergaat vanwege een aneurysma aortae abdominalis in aortasegment C dat ongepland wordt heropgenomen binnen 30 dagen na ontslag. |
| Teller A | Aantal patiënten dat een primaire electieve operatie/interventie* ondergaat vanwege een aneurysma aortae abdominalis in aortasegment C dat ongepland wordt heropgenomen binnen 30 dagen na ontslag. |
| Teller B | Aantal patiënten dat een primaire operatie/interventie* ondergaat vanwege een acuut symptomatisch aneurysma aortae abdominalis in aortasegment C dat ongepland wordt heropgenomen binnen 30 dagen na ontslag. |
| Teller C | Aantal patiënten dat een primaire operatie/interventie* ondergaat vanwege een geruptureerd aneurysma aortae abdominalis in aortasegment C dat ongepland wordt heropgenomen binnen 30 dagen na ontslag. |
| Noemer A | Aantal patiënten dat een primair electieve operatie/interventie* ondergaat vanwege een aneurysma aortae abdominalis in aortasegment C. |
| Noemer B | Aantal patiënten dat een primaire operatie/interventie* ondergaat vanwege een acuut symptomatisch aneurysma aortae abdominalis in aortasegment C. |
| Noemer C | Aantal patiënten dat een primaire operatie/interventie* ondergaat vanwege een geruptureerd aneurysma aortae abdominalis in aortasegment C. |
| Definitie (s) | *Operatie/interventie: zowel de open als endovasculaire behandeling van het aneurysma. |
| In-/ exclusiecriteria | Zie DSAA in- / exclusiecriteria |
| Norm | - |
| Uitvraag over periode | 01-01-2017 t/m 31-12-2019 (berekend over 3 jaren) |