

	Slokdarmcarcinoom (n=3600)					Maagcarcinoom (n=2376)					© DUCA
	2011 %	2012 %	2013 %	2014 %	2015 %	2011 %	2012 %	2013 %	2014 %	2015 %	
<b>Preoperatieve therapie*</b>	(n=549)	(n=684)	(n=726)	(n=781)	(n=846)	(n=290)	(n=385)	(n=525)	(n=562)	(n=464)	
wel preoperatieve therapie	92%	89%	89%	89%	91%	55%	57%	52%	56%	61%	
chemotherapie	12%	12%	7,9%	7,0%	5,4%	52%	53%	50%	55%	59%	
chemoradiotherapie	80%	77%	81%	81%	86%	1,4%	2,1%	1,5%	1,4%	2,2%	
<b>Operatie</b>	(n=550)	(n=693)	(n=728)	(n=782)	(n=847)	(n=313)	(n=416)	(n=564)	(n=587)	(n=496)	
<b>Type operatie</b>											
THOCR	49%	38%	34%	29%	25%	1,3%	0,7%	1,1%	0,3%	0,4%	
TTOCR	43%	56%	59%	64%	69%	0,3%	1,2%	0,2%	0,2%	1,2%	
totale maagresectie	1,3%	1,2%	2,5%	2,7%	2,6%	35%	35%	37%	38%	38%	
partiële maagresectie	0,4%	0,3%	0,1%	0,3%	0,0%	56%	50%	48%	50%	51%	
geen resectie	5,5%	4,2%	4,3%	4,0%	3,4%	6,4%	12%	13%	10%	8%	
<b>Benadering</b>											
open	69%	58%	50%	35%	29%	96%	91%	74%	56%	46%	
minimaal invasief^	31%	42%	50%	65%	71%	4%	8%	26%	43%	54%	
<b>Aanvullende resectie</b>											
ja	3,2%	3,0%	3,0%	3,2%	3,2%	7,7%	12%	10,3%	9%	13%	
<b>Type reconstructie**</b>	(n=520)	(n=662)	(n=695)	(n=752)	(n=818)	(n=291)	(n=369)	(n=485)	(n=528)	(n=455)	
geen	0,0%	0,0%	0,3%	0,9%	0,7%	3,4%	2,4%	1,9%	2,8%	1,1%	
buismaag	97%	98%	95%	94%	95%	2,7%	3,3%	2,5%	0,8%	2,0%	
coloninterponaat	1,0%	0,3%	0,6%	1,3%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%	0,4%	
jejunuminterponaat	0,0%	0,2%	0,1%	0,1%	0,2%	1,0%	3,5%	3,1%	0,2%	1,5%	
oesophagojejunostomie	1,0%	0,9%	2,7%	2,5%	2,9%	35%	40%	44%	41%	39%	
gastroenterostomie	0,4%	0,3%	0,1%	0,5%	0,0%	57%	49%	47%	52%	55%	
<b>Ligging anastomose**</b>											
geen anastomose	0,2%	0,0%	0,3%	0,7%	0,6%	1,4%	1,4%	0,8%	1,1%	0,9%	
hals	86%	80%	66%	61%	55%	0,7%	1,1%	1,0%	0,6%	1,3%	
intrathoracaal	11%	17%	29%	36%	43%	2,7%	6,8%	9,5%	7,6%	6,8%	
intra-abdominaal	1,3%	1,2%	1,9%	0,9%	1,1%	91%	85%	85%	88%	90%	
<b>Postoperatieve therapie***</b>	(n=520)	(n=656)	(n=691)	(n=749)	(n=814)	(n=265)	(n=336)	(n=462)	(n=502)	(n=423)	
wel postoperatieve therapie	5,4%	5,2%	4,8%	3,9%	4,2%	35%	39%	34%	40%	45%	
chemotherapie	5,2%	4,6%	2,9%	3,3%	3,4%	29%	29%	26%	31%	36%	
chemoradiotherapie	0,2%	0,0%	0,3%	0,1%	0,2%	5,7%	8,3%	8,0%	7,4%	8,7%	
radiotherapie	0,0%	0,6%	0,3%	0,4%	0,2%	0,0%	0,0%	0,2%	0,4%	0,0%	

Behandelingskarakteristieken van de analyseerbare patiënten met een slokdarm- of maagcarcinoom in DUCA (2011-2015).

THOCR = transhiatale oesofaguscardiaresectie; TTOCR = transthoracale oesofaguscardiaresectie.

\* patiënten bij wie een in-opzet-curatieve resectie gepland was.

\*\* patiënten die een resectie ondergingen.

\*\*\* patiënten die een curatieve resectie ondergingen, zoals tijdens de operatie bepaald.

Percentages tellen niet altijd op tot 100 omdat de optie 'onbekend' niet in de tabel is opgenomen.

^ Zoals bepaald bij aanvang van operatie, inclusief conversies.